

带状疱疹ワクチンの比較表

種類	不活化ワクチン (乾燥組換え带状疱疹ワクチン)	生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン)
接種方法	筋肉内注射	皮下注射
接種回数	2回 (1回目接種後、2カ月経過後に2回目を接種)	1回
接種料金	1回あたり、20,000円～25,000円程度	1回あたり、7,000円～10,000円程度
発症予防効果の推移	1年目(97.7%)、6年目(88.5%) 10年目(73.2%)	1年目(67.5%)、5年目(37.2%)
免疫の持続期間	約10年程度	約5年程度
副反応	<p>注射部位 疼痛(79.1%) 発赤(37.4%) 腫脹(24.2%)</p> <p>全身症状 筋肉痛(36.9%) 疲労(34.6%) 頭痛(28.3%) 悪寒(21.4%) 発熱(16.7%) 胃腸症状(12.0%) など</p> <p>非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。</p>	<p>注射部位 発赤(44.0%) そう痒感(27.4%) 熱感(18.5%) 腫脹(17.0%) 疼痛(14.7%) 硬結(13.5%)</p> <p>全身症状 発疹(5%未満) 倦怠感(5%未満) など</p> <p>非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎など重篤な副反応が現れることがあります。</p>

出典:ワクチン添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料